



Moderhinke: Biosicherheit

Wie verhindere ich, dass der Moderhinke-Erreger in meine Herde eingeschleppt wird?



Stallfremde Personen: Besucher, Tierärzte

- Desinfektion¹ der Stiefel oder Schuhe (Wanne, Desinfektionsmatte)
- Betriebseigene Stiefel oder Überziehschuhe bereithalten / anbieten



Tierzukauf / Austausch von Widdern

- Quarantäne vor Integration in Herde
- Klauenbad² zu Beginn der Quarantäne (Standbad, während mindestens 10 Minuten)
- Im Zweifelsfall Entnahme von Tupferproben (frühestens 10 Tage nach dem letzten Klauenbad, auf eigene Kosten)



Nach Ausstellungen, Transporten oder nach Schafschur

- Klauenbad² (Standbad, während mindestens 10 Minuten)

Transportfahrzeuge

- Vor und nach dem Gebrauch gründlich reinigen und desinfizieren¹

¹**Desinfektionsmittel** für Stiefelbad oder Oberflächen und Gerätschaften: Desintec® Hoofcare spezial D, Virkon® S, P3-oxisan®ZS, Halag Stalldes 05

²**Klauenbademittel:** Desintec® Hoofcare spezial D

Quarantäne

Idealerweise während 4 Wochen, aber mindestens 14 Tage, separate Haltung in räumlich abgetrennter Stallbucht, welche nach der Quarantäne gereinigt und desinfiziert¹ werden kann. Separate Stiefel und Überkleider sowie Einweghandschuhe für die Arbeiten im Quarantänebereich verwenden.